

высокая (до 50%). Восточная Прибалтика входит в зону низких частот.

5. Основно-верхнечелюстной шов (ОВЧ). В европеоидных группах этот признак част (выше 20%). Низкая встречаемость, свойственная многим сибирским группам, в Европе зафиксирована у немцев, саамов, марийцев, мордвы, удмуртов. Восточноприбалтийские же группы с их очень высокими частотами не обнаруживают в этом отношении никакого ослабления европеоидности.

По совокупности признаков наиболее своеобразна латышская серия. По признакам I и 2 эта группа несколько склоняется в "восточном" направлении, однако по признаку 5 она столь же отчетливо европеоидна, как и остальные. Значения признака 3 у латышей и, возможно, у литовцев из Каваркосса заставляют думать о южноевропеоидном компоненте.

В целом взаимоположение групп мало соответствует степени их лингвистической близости. Латши ближе всего к финнам, литовцы и эстонцы - к русским, финны - к латышам.

С.Павilonis (Вильнюс)

ГЕОГРАФИЯ ГРУПП КРОВИ У ЛИТОВЦЕВ

Распространение групп крови изучалось рядом авторов главным образом в давнее время, но исследования не охватывали всей территории этнографической Литвы. Нами серологически изучены группы крови у физически здоровых мужчин литовской национальности. Исследование проводилось в г. Вильнюсе в 1966 г. Обследовано 2640 лиц.

У обследованного контингента литовцев частота встречаемости групп крови следующая: О - 35,68%; А - 35,83%; В - 21,4%; AB - 6,32%. По Оттенбергу (1925), это распределение соответствует европейскому типу ($O > A > B$) на границе с интермедиарным типом ($O > A > B$).

Обследованные нами лица происходили из разных районов Литовской ССР, однако некоторые районы были представлены небольшим количеством данных, поэтому все данные сгруппированы по крупным этнографическим зонам Литвы.

Таблица 1
Группы крови АBO (%) в этнографических зонах Литвы

Этнографическая зона	Число обследованных	0	A	B	AB
Аукштайты	868	38,36	35,52	19,69	5,41
Средняя Литва	854	34,19	35,36	24,12	6,31
Жемайты	717	34,72	35,98	22,31	6,97
Сувалкеты	201	33,32	34,32	23,33	7,96
Литовская ССР, всего	2640	35,68	35,83	21,40	6,32

Данные во всех зонах аналогичны, только у аукштайтов отмечается более частая встречаемость группы 0. По существу, аналогичное распределение групп крови отмечается в соседних популяциях Латвии, Белоруссии, Польши.

И.Саливон (Минск)

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТИПА БЕЛОРУСОВ И ВОПРОСЫ БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ СВЯЗЕЙ

Первые попытки этногенетических интерпретаций особенностей физического типа белорусов предпринимались в конце XIX в. (Д.Н.Анучин, 1888; Н.А.Янчук, 1891; К.Н.Иков, 1891; Е.Р.Эйкгольц, 1896).

Сходство физического типа современного населения северо-западных, северных, северо-восточных и прилегающих к ним районов БССР с населением Восточной Прибалтики обратило на себя внимание ряда исследователей (В.В.Бунак, 1956;